

Nota de prensa de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM) tras la información de la AEMPS dependiente del Ministerio de Sanidad sobre un tipo poco frecuente de cáncer relacionado con algunos implantes mamarios

Sobre la noticia publicada en el periódico las Provincias del 27 de junio de 2025, la SESPAM decide remitir esta Nota de Prensa, ya que en el seno de sus reuniones anuales con los Coordinadores de Unidades de Mama de los hospitales españoles, presentó en su octava reunión su **DOCUMENTO DE CONSENSO 2019** acerca del

“DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL LINFOMA ANAPLASICO DE CELULAS GRANDES ASOCIADO A IMPLANTES MAMARIOS”

Siendo SESPAM la Sociedad científica española que con su carácter multidisciplinar aborda la patología de la mama y la salud mamaria, varios de sus miembros de Junta Directiva formaron parte en su día de los grupos de trabajo encargados de tratar el diagnóstico y tratamientos asociados a un tipo determinado de implantes mamarios.

Desde 2012, el Ministerio de Sanidad ha confirmado más de **100 casos en España** de un cáncer poco frecuente vinculado al uso de **implantes mamarios**, ya sea con fines estéticos o reconstructivos tras un cáncer de mama. Se trata del **linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios (BIA-ALCL)**, un tipo de linfoma que **no afecta al tejido mamario**, sino al área alrededor de la prótesis, especialmente en implantes con superficie **rugosa o texturizada**.

Descubierto hace 27 años, el BIA-ALCL ha sido objeto de numerosos estudios científicos internacionales. Actualmente, **los implantes texturizados han dejado de utilizarse casi por completo** en la práctica clínica habitual.

Datos clave sobre el BIA-ALCL

- **Incidencia estimada:** entre 1 caso por cada 30.000 a 300.000 mujeres con implantes.
- **Incidencia anual internacional:** entre 0,1 y 0,2 casos por cada 100.000 mujeres.
- **España:** 102, con 4 fallecimientos (mortalidad del 4%).
- **Casos mundiales hasta 2024:** 1.687 casos confirmados en 51 países con 59 fallecimientos (mortalidad global: 3,4%).

¿Cuáles son los síntomas y qué hacer?

El síntoma más habitual es la aparición repentina de **líquido alrededor de la prótesis** (seroma), que la paciente suele notar como un aumento de volumen sin explicación. Si se produce este signo, se recomienda consultar inmediatamente con una **Unidad de Mama especializada** o con el **cirujano que realizó la intervención**.

Actuación y seguimiento

Gracias al **Protocolo Clínico Nacional vigente desde 2019**, la mayoría de los casos han evolucionado favorablemente mediante la **extracción del implante y del tejido afectado**, seguido de evaluación oncológica especializada. Este protocolo detalla los

criterios diagnósticos, las indicaciones de cirugía y los pasos para el seguimiento médico.

Recomendaciones de la SESPM (Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria)

- No se aconseja retirar los implantes de forma preventiva si no hay síntomas.
- Acudir al médico ante inflamación repentina, líquido alrededor de la prótesis o cambios visibles en el pecho.
- Recordar que **los implantes no son dispositivos permanentes** y pueden requerir revisión o recambio con el tiempo.
- Notificar cualquier cambio o molestia directamente al especialista.

<https://sespm.es/wp-content/uploads/2025/07/CONSENSO-SESPM-2019.pdf>